DLP20-8-93119656

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION
GRANDES CULTURES
C.P.P.A.P. N° 1859 AD
AVERTISSEMENTS AGRICOLES AQUITAINE
N° ISSN 0763.7314

BULLETIN TECHNIQUE N° 11 — ABONNEMENT ANNUEL : 330 F

**JEUDI 19 AOUT 1993**

**MAIS**

* CIRPHIS : SURVEILLEZ LES INFESTATIONS DE 2EME GENERATION.

* PYRALE ET SESAMIE : RAPPEL CONCERNANT LES DATES D'INTERVENTION.

# MAIS

## CIRPHIS

Les infestations de 2ème génération de la noctuelle des graminées se confirment et sont actuellement observables en *Bassin de l'Adour* et *région des Gaves,* en situations à fort enherbement en graminées estivales.

Sur maïs Les défoliations se développent à partir des feuilles de base, et peuvent remonter jusqu'à la feuille de l'épi, voire au-dessus.

Une intervention insecticide est nécessaire lorsque les dégâts atteignent la seconde feuille (F-2, F0 étant la feuille de l'épi) sous l'épi. Il est alors préconisé d'utiliser une des spécialités autorisées contre noctuelle terricole à la dose portée dans le dépliant AGPM/SPV joint au bulletin n° 3 du 9 avril 1993.

## PYRALE ET SESAMIE

Rappelons la nécessité d'effectuer au moins une intervention avant le 20 août contre les secondes générations de ces ravageurs ; un renouvellement (persistance de 15 jours) en 1ère décade de septembre est à prévoir pour les parcelles récoltées après le 20 septembre, afin de maîtriser les dégâts de la 3ème génération partielle de sésamie, et de la fin de la 2ème génération de pyrale.



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT / PROTECTION DES VÉGÉTAUX
51, rue Kieser 33077 Bordeaux Cedex - Tél. 56 00 42 03 • Télécopieur 56 00 42 31
Régisseur de Recettes : D.R.A.F. AQUITAINE • CCP BORDEAUX 6 700 09 P
BULLETIN TECHNIQUE / PUBLICATION PÉRIODIQUE- imprimé à la Station d'Avertissement Agricoles / Directeur-Gérant : A. GRAVAUD

P69

# QUESTIONNNAIRE MILDIOU

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. : Fax. :

Nombre de parcelles touchées : Toutes /__/ Quelques unes /__/ 1 ou 2 /__/

## Pour la parcelle la plus touchée

Cépage :

Année de plantation :

Vigueur : Faible /__/ Moyenne /__/ Forte /__/

Situation : Côteau /__/ Bas fond /__/ A plat /__/

Sol : Filtrant /__/ Rétention de l'eau /__/

## Symptômes

1ers dégâts observés :

*Sur feuilles** /__/ Date /___/___/___/

*Sur grappe** /__/ Date : Rot gris* /___/___/___/
Rot brun* /___/___/___/

Evolution des dégâts :

| Date d'observation | Intensité sur feuille* | Rot gris* | Rot brun* | Observation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**(*) Note de 1 à 3 en fonction de l'échelle proposée ci-dessous** :

Intensité sur feuille* :

Quelques taches* = /1/
≃ 1 tache/cep* = /2/
plus d'une tache/cep* = /3/

Intensité sur grappe* :

Moins de 1 % des grappes = /1/
2 - 10 % = :2/
+ de 10 % = /3/

P..../...70

# CALENDRIER DES TRAITEMENTS

| Date | Spécialité anti-mildiou | Dose/ha | Volume de bouillie/ha | Nombre de rangs traités par passage | Type de pulvérisateur | Pluviométrie depuis le traitement précédent | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |